

سقط



معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
گروه تخصصی جمعیت، خانواده و تغذیه

✓خروج محصولات بارداری قبل از هفته ۲۲ بارداری
را سقط می گویند.

✓گاهی عواملی اثر می گذارند تا تخم لانه گزینی
شده دفع شود.

✓علل سقط مادری ، جنینی و محیطی می باشد



بیماری های کروموزومی، بیماری های عفونی، رحم های دوشاخه، استرس، ضربه، فشار و ... می تواند باعث دفع تخم و جنین شود.

اگر سقط به دلیل بیماری مادر یا جنین باشد سقط قانونی شکل می گیرد.



گاهی سقط عمدی است که معمولاً در پی بارداری های
ناخواسته است که با تحریک و ... سقط غیر قانونی رخ
می دهد که اغلب با خونریزی شدید، عفونت و شوک
عفونی همراه هستند و در اکثر موارد منجر به مرگ
مادر می شوند.



بروز عفونت و زخم‌های عفونی در خارج و داخل رحم
به دلیل دستکاری‌های انجام شده در حین ختم
حاملگی، می‌تواند منجر به عفونت لوله و چسبندگی
داخل رحمی و عقیمی دائم زن شود.



متاسفانه سقط های عمدی یکی از دلایل مهم مرگ
مادر است.

خونریزی از علایم معمول سقط بوده ولی می تواند درد
کمر، درد زیر شکم و باز بودن یا بسته بودن دهانه رحم
در هنگام معاینه را نیز به آن اضافه کرد.

تخمک گذاری ممکن است خیلی زود حتی ۲ هفته
بعد از سقط روی دهد.

