

## بهداشت دهان و دندان در کودکان زیر ۳ سال



پنجمین  
۲۲۰۴۵۴۶۲


\* پس از مصرف قطره آهن یا سایر شربت‌های دارویی به کودک آب بدھید زیرا این داروها حاوی قند هستند.

\* میکروب‌های پوسیدگی زالزال دهان بزرگ‌سالان به دهان کودک انتقال می‌یابند. بنابراین وسائلی مانند قاشق، مسواک و خمیر دندان کودک باید از سایر افراد (حتی مادر کودک) جدا باشد.

\* اولین ملاقات دندانپزشکی کودک باید حداقل تا یک سالگی صورت پذیرد. در معاینه اولیه کودک با دندانپزشکی آشنایی گردد و والدین از وظایف خود در حفظ سلامت دهان و دندان کودک مطلع می‌شوند. بعد از اولین ملاقات معاینات دوره‌ای شش ماهه دندانپزشکی توصیه می‌گردد



معاونت سلامت  
مرکز مدیریت بیماریها



اداره سلامت دهان و دندان  
Oral Health Bureau

سازمان بهداشت و آنستیتوی علوم پزشکی

استفاده از خمیر دندان به سن بالاتر موکول گردد و یا از خمیر دندان فاقد فلوراید استفاده شود.



کودکان به تنها بی قدر به مسواک زدن صحیح نیستند. برای مسواک زدن بهتر است پدر یا مادر روی زمین بنشینند و پاهای خود را در مقابل کودک دراز نمایند به طوری که کودک بین پاهای والد به گونه‌ای قرار گیرد که بازوها و پاهایش قابل کنترل کردن باشد و سپس مسواک زدن را برای کودک آغاز نماید.

### سایر توصیه‌ها به والدین :

- \* هر چه زودتر مهارت نوشیدن با استکان یا فنجان را به کودک آموخته دهید.
- \* از دادن آب قند، چای شیرین و سایر مایعات شیرین به کودک، به خصوص هنگام خواب خودداری نمایید.
- \* حتی الامکان به عنوان میان وعده از انواع سبزی‌ها، میوه‌ها و آجیل استفاده نمایید. در صورت تمایل به میان وعده شیرین، از خرما و کشمش استفاده نمایید.

بنام خدا  
دندان های شیری



دندان های شیری در تغذیه و تکلم کودک نقش عمده ای به عهده دارند. زمان رویش آن ها از شش ماهگی تا حدود سی ماهگی می باشد.

پوسیدگی زودرس دندانی

نوعی از پوسیدگی وسیع دندانی است که بر اثر عدم رعایت بهداشت دهان و دندان و عادات غلط تغذیه ای در کودکان زیر ۶ سال پدید می آید. پوسیدگی زودهنگام کودک، باعث مشکلات دندانی - فکی، از دست دادن دندان های شیری و به هم خوردن تغذیه کودک می گردد.



نکته مهم

توصیه می گردد کودک تا ۲۴ ماهگی از شیر مادر استفاده کند. شیر مادر در حفظ سلامت بدن و دندان های کودک نقش موثری دارد.

از یک تکه گاز تمیز مرطوب دور انگشت سبابه استفاده نمایید.



گاز تمیز را دور انگشت سبابه پیچیده و لشه بالا و پایین را به آهستگی تمیز نمایید.



این کار را حداقل دو بار در روز بعد از اولین و آخرین وعده غذایی انجام دهید که ۱-۲ دقیقه طول می کشد.

کودک ۱ تا ۳ ساله

از یک سالگی، کودک باید با مسوак آشنا گردد. بهتر است قبل از شروع مسواك زدن کمی خمیر دندان (به اندازه یک دانه برنج) برای کودک یک ساله و کمتر از یک نخود برای کودک بزرگتر) روی مسواك مالییده شود و تمام سطوح داخلی و خارجی و جونده دندان ها تمیز گردد. اگر کودک قادر به بیرون ریختن اضافه خمیر دندان نیست،

تمیز کردن لشه و دندان های کودک

تمیز کردن لشه قبل از رویش دندان ها توصیه می شود. در کودکان زیر ۳ سال مسواك انگشتی و سیله ای ساده و موثر جهت ماساژ لشه و تمیز کردن دندان ها می باشد.

- برای کم کردن ناراحتی کودک در حین رویش دندان، مسواك انگشتی را ۳۰ دقیقه در فریزر قرار داده و سپس با ملایمت لشه را با آن ماساژ دهید.
- جهت تمیز کردن آن از مایع ظرفشویی می توانید استفاده کنید.
- هر ۳ تا ۴ ماه یکبار آنرا تعویض نمایید.
- می توانید از سایر انواع مسواك های مخصوص کودکان نیز استفاده نمایید.

تمیز کردن دندان ها در کودک زیر یک ساله:

جهت تمیز کردن دندان های کودک زیر یک سال می توانید کودک را در حالی که سرش به سمت بدن شما و پاها یا از شما دور می باشد، قرار دهید. برای باز کردن دهان کودک انگشت سبابه خود را به آهستگی به گونه کودک فشار دهید. مسواك انگشتی را روی انگشت اشاره قرار دهید و به آرامی و با حرکات ملایم لشه و سطوح دندانی کودک را تمیز کنید. در صورت عدم دسترسی به مسواك انگشتی می توانید