

معاون محترم بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: پیگیری رتینوپاتی نارسی

با سلام و احترام

بنا بر اهمیت پیشگیری و درمان به موقع نوزادان در معرض خطر رتینوپاتی نارسی و برخی ابهامات و پرسش‌ها درباره فرایند‌های مراقبت رتینوپاتی نارسی موارد زیر برای آگاهی و اجرا اعلام می‌گردد

- در قسمت ارزیابی کودک از نظر بینایی در بوکلت کودک سالم در صورت مواجه شدن با نشانه "کورک نارس به دنیا آمده است" نوزاد، نیازمند بررسی مطابق فلوچارت بررسی نوزاد از نظر رتینوپاتی نارسی می‌باشد. بر اساس آخرین شواهد ملی، نوزادان با سن بارداری کمتر از ۲۴ هفته (۳۳ هفته و ۶ روز یا کمتر) و یا وزن تولد ۲۰۰۰ گرم یا کمتر، در معرض خطر رتینوپاتی نارسی می‌باشند و می‌بایست از نظر رتینوپاتی نارسی غربالگری شوند. انجام غربالگری در صورت مراجعه والدین به مراکز رتینوپاتی نارسی منوط به داشتن معرفی نامه پزشک است.
- نوزادان متولد شده با سن بارداری ۲۷ هفته یا بیشتر، باید ۴ هفته پس از تولد معاینه و غربالگری شوند. زمان اولین معاینه در نوزادان متولد شده با سن بارداری کمتر از ۲۷ هفته نیز در جدول زیر آمده است.

جدول سن نوزاد در اولین معاینه	
سن بارداری در زمان تولد (هفته / روز)	زمان اولین معاینه پس از تولد (هفته / روز)
۲۲	۹ هفته پس از تولد یا ۶۳ روزگی
۲۳	۸ هفته پس از تولد یا ۵۶ روزگی
۲۴	۷ هفته پس از تولد یا ۴۹ روزگی
۲۵	۶ هفته پس از تولد یا ۴۲ روزگی
۲۶	۵ هفته پس از تولد یا ۳۵ روزگی
۲۷ و بیشتر	۴ هفته پس از تولد یا ۲۸ روزگی

- همه نوزادان با وضعیت ناپایدار بالینی یا مسیر درمانی پیچیده مانند اکسیژن درمانی ، تجویض خون یا شناسایی در معرض خطر بودن توسط پزشک معالج، باید توسط چشم پزشک دوره دیده از نظر رتینوپاتی معاینه شوند.

- انجام معاینه مطابق با جدول پیشگفت در تاریخ اعلام شده در هر بار مراجعه نوزاد به چشم پزشک دوره دیده بسیار مهم است و هرگونه تأخیر می تواند عواقب جبران ناپذیری چون کوری و نابینایی نوزاد را به همراه داشته باشد.

- وظیفه انجام معاینات رتینوپاتی نارسی و اقدام درمانی مناسب آن به عهده چشم پزشک دوره دیده است فرایند انجام مراقبت نوزادان در معرض خطر رتینوپاتی نارسی به شرح زیر می باشد
 - شناسایی نوزادان در معرض خطر
 - انجام معاینه مورد نیاز
 - پیگیری و درمان در موعد مقرر

- لازم است مراقبان نوزادان در مراکز سلامت جامعه، خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت ، مطب ها و در اولین مراجعه نوزاد برای دریافت مراقبت، در قسمت ارزیابی بینایی کودک در صورت نارسی یا کم وزنی مطابق با شرح بند اول از والدین در خصوص انجام معاینه چشم نوزاد توسط چشم پزشک پرسیده شود و در صورت انجام نشدن معاینه مطابق با نمودار پیوست برای انجام معاینه ارجاع شود و در صورت انجام معاینه و تعیین زمان های پیگیری، با کنترل خلاصه پرونده ترجیح این گروه نوزادان، توصیه به انجام معاینات و اعلام تاریخ توصیه لازم به والدین برای پیگیری انجام به موقع معاینات انجام شود.

- از آنجا که انجام نشدن معاینه نوزادان در معرض خطر رتینوپاتی نارسی می تواند منجر به نابینایی و کوری چشم گردد بایستی نکات زیر به والدین نوزادان نارس تا زمان رفع خطر تأکید گردد:

- انجام معاینه چشم نوزادان نارس توسط چشم پزشک دوره دیده الزامی است
- در صورت اجرای معاینه و ضرورت معاینات پیگیری، انجام معاینات در زمان های تعیین شده توسط چشم پزشک ضروری می باشد.




۱۳۹۷/۰۴/۰۶
۵۳۸۴/۰۲/۳۰
شماره
تاریخ
ندارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



نوزاد نیازمند غربالگری رتینوپاتی نارسی



دکتر سید حامد برکاتی

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس